

BOSQUES DE CASTANEA SATIVA

9260 (Directiva 92/43/EEC)

T18, T19, T1B, T1E (EUNIS)


ESPECIES	Herbácea %	Arbusto %	Arbóreo %
<i>Castanea sativa</i>			
<i>Corylus avellana</i>			
<i>Fraxinus ornus</i>			
<i>Hedera helix</i>			
<i>Prunus avium</i>			
<i>Arbutus unedo</i>			
<i>Avenella flexuosa</i>			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>			
<i>Crataegus monogyna</i>			
<i>Dryopteris affinis</i>			
<i>Fagus sylvatica</i>			
<i>Lathyrus niger</i>			
<i>Ostrya carpinifolia</i>			
<i>Physospermum cornubiense</i>			
<i>Pteridium aquilinum</i>			
<i>Quercus petraea</i>			
<i>Quercus pubescens</i>			
<i>Quercus robur</i>			
<i>Sorbus torminalis</i>			
<i>Acer campestre</i>			
<i>Agrostis castellana</i>			
<i>Buxus sempervirens</i>			
<i>Calluna vulgaris</i>			
<i>Cistus populifolius</i>			
<i>Cistus salviifolius</i>			
<i>Cornus mas</i>			
<i>Cornus sanguinea</i>			
<i>Cytisus scoparius</i>			
<i>Digitalis lutea</i>			
<i>Erica arborea</i>			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>			
<i>Euphorbia characias</i>			

ESPECIES	Herbácea %	Arbusto %	Arbóreo %
<i>Fragaria vesca</i>			
<i>Fraxinus excelsior</i>			
<i>Ilex aquifolium</i>			
<i>Juniperus communis</i>			
<i>Juniperus oxycedrus</i>			
<i>Lotus dorycnium</i>			
<i>Luzula forsteri</i>			
<i>Luzula nivea</i>			
<i>Melica uniflora</i>			
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>			
<i>Phillyrea angustifolia</i>			
<i>Pinus pinaster</i>			
<i>Pistacia terebinthus</i>			
<i>Poa nemoralis</i>			
<i>Quercus cerris</i>			
<i>Quercus frainetto</i>			
<i>Quercus ilex</i>			
<i>Rubia peregrina</i>			
<i>Salvia glutinosa</i>			
<i>Sanicula europaea</i>			
<i>Sorbus aria</i>			
<i>Sorbus domestica</i>			
<i>Teucrium scorodonia</i>			
<i>Viburnum tinus</i>			
<i>Satureja vulgaris</i>			


PARÁMETROS ESTRUCTURALES




cobertura
arbórea




cobertura
arbustiva




cobertura
herbácea




IBP



número de
microhábitats



etapa máxima de
descomposición



IDENTIFICACIÓN DE ESTRATOS

El **estrato arbóreo** incluye especies leñosas de más de 3 metros de altura.

El **estrato arbustivo** incluye especies leñosas de entre 1 y 3 metros de altura.

El **estrato herbáceo** incluye individuos de menos de 1 metro de altura (ya sean herbáceos o leñosos).

dosel arbóreo: $h > 3 \text{ m}$



arbustos: $1 < h < 3 \text{ m}$



hierbas: $h < 1 \text{ m}$



EVALUACIÓN DE LA COBERTURA

La cobertura de cada estrato se define por la **proyección del área cubierta por los individuos** de ese estrato, expresada como **porcentaje del área total** de la unidad de muestreo.



ESQUEMA DE PORCENTAJE DE COBERTURA

Representación gráfica de diferentes valores de cobertura a modo de referencia.

A modo de ejemplo

En una unidad de muestreo cuadrada de 15 x 15 metros, una cobertura del:

- 10 % significaría que una especie cubre 22,5 m²,
- 20 % significaría que una especie cubre 45 m²,
- 30 % significaría que una especie cubre 67,5 m², etc.

